

MYCOUP
Referência: FT-00253**COMPOSIÇÃO***Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov.*12 x 10⁴ propágulos/l*Excipiente: substrato mineral argiloso***CLASSIFICAÇÃO**

PRODUTO COM MICORRIZAS.

Reconhecido para comercialização em Portugal pela DGAE ao abrigo do Regulamento (UE) N.º 2019/515 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março de 2019 relativo ao Reconhecimento Mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-Membro e que revoga o Regulamento (CE) N.º 764/2008.



Produto adequado para uso em Agricultura Biológica conforme exigido pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/1165 da Comissão, Anexo I, que estabelece as normas de execução do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho. Confirmação de compatibilidade emitida pela EcoCert (<https://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?id=278>).

Produto RESÍDUO ZERO.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Formulação	Pó
Estado físico	Sólido
Cor	Castanho
Densidade	1,41 kg/l
pH	7,98

PROPRIEDADES

O MycoUp é um inoculante micorrízico à base de *Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov.*, inoculado sobre substrato sólido de mineral argiloso, uma espécie de fungo simbiótico endomicorrízico arbuscular de alto grau de eficiência e estabilidade biológica, avaliado com êxito em diversas condições edafoclimáticas. Nesta relação de

Versão 9 de 14/07/2026

SEDE
OLHÃOParque Hubel, Pechão
8700-179 OlhãoT. +351 289 710 515
(Chamada para rede fixa nacional)INSTALAÇÕES DE
ALPIARÇAZona Industrial, lotes 55 e 56
2090-242 AlpiarçaINSTALAÇÕES DE
FERREIRA DO ALENTEJOParque de Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do AlentejoINSTALAÇÕES DE
MANGUALDERua da Regada nº1, Fundões
3530-347 Santiago de Cassurrães

E. verde@hubel.pt

www.hubelverde.pt

benefício mútuo, a planta proporciona açúcares ao *Glomus iranicum var. tenuihypharum*, indispensáveis à sua sobrevivência, enquanto por sua vez o fungo proporciona nutrientes e água à planta.

A utilização do fungo formador de micorrizas *Glomus iranicum var. tenuihypharum* apresenta 3 vantagens principais sobre outros tipos de micorrizas:

- 1) Tem uma produção abundante de micélio extramático, fundamental para a transferência eficiente de nutrientes e água do solo para a planta;
- 2) Produz esporulação externa da raiz, pelo que a integridade radicular não é comprometida. Assim assegura um transporte mais eficiente de nutrientes e água e menor custo energético para a planta;
- 3) Tolerância a elevadas concentrações de fertilizantes permite integração perfeita com os protocolos de fertilização de agricultura intensiva e elevada resistência a condições salinas.

O MycoUp actua directamente ao promover uma intensa colonização micorrízica do sistema radicular das plantas, o qual provoca um maior crescimento radicular, permite maior absorção de água e nutrientes da solução do solo, bem como um maior vigor e rendimento das culturas. Protege também a cultura contra adversidades climáticas.

- Favorece o crescimento das plantas e incrementa o rendimento agrícola, optimiza o aporte de fertilizantes e de água do solo e regula o seu balanço hormonal;
- Aumenta a tolerância das plantas à seca e à salinidade e aumenta as reservas na planta;
- Proporciona uma certa protecção do sistema radicular contra doenças fúngicas;
- Melhora a qualidade organoléptica dos frutos, assim como a actividade fotossintética, que se traduz no aumento da concentração de açúcares, expressa em °Brix, e melhor vida pós-colheita;
- Evita a degradação dos solos e contribui para a sua regeneração através duma eficaz rede micelar;
- Evita as perdas de CO₂ através da sua captura e reconversão em biomassa fúngica;
- O seu uso estabiliza o funcionamento ecológico e a produtividade dos ecossistemas, assim como a homogeneidade e regularidade produtiva da cultura;
- Uma vez que é um produto biológico, não produz resíduos indesejáveis nas plantas nem altera as características genéticas das culturas e das colheitas.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

A sua utilização está indicada para a maioria das culturas com interesse agrícola, excepto as plantas pertencentes às seguintes famílias: poligonáceas, urticáceas, crucíferas, fumariáceas, quenopodiáceas, ciperáceas e comelináceas.

Dissolver previamente em água e aplicar de forma imediata na zona de influência das raízes mediante injeção, rega gota-a-gota ou qualquer outro sistema que assegure uma correcta incorporação do produto no solo. É recomendado manter a solução em constante agitação e iniciar a rega apenas com água e incorporar o produto no final da rega.

Versão 9 de 14/07/2026

SEDE OLHÃO

Parque Hubel, Pechão
8700-179 Olhão

T. +351 289 710 515
(Chamada para rede fixa nacional)

INSTALAÇÕES DE ALPIARÇA

Zona Industrial, lotes 55 e 56
2090-242 Alpiarça

INSTALAÇÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO

Parque de Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do Alentejo

INSTALAÇÕES DE MANGUALDE

Rua da Regada nº1, Fundões
3530-347 Santiago de Cassurrães

E. verde@hubel.pt

www.hubelverde.pt

- Hortícolas (estufa, ar livre ou hidroponia): aplicar 3 kg/ha, a partir dos 7 dias após o transplante;
- Morango: aplicar 3 kg/ha, a partir dos 20 dias após o transplante;
- Em culturas lenhosas (citrinos, fruteiras de caroço e de semente, tropicais e subtropicais, olival, vinha, etc.), aplicar no início do abrolhamento ou após a colheita:
 - 2 kg/ha em plantações jovens;
 - 3 kg/ha em plantações adultas.
- Viveiros: inoculação com 300 g/m³ de substrato.

Em caso de utilização em conjugação com produtos à base de *Trichodermas*, é aconselhável manter um intervalo de 10 dias entre as respectivas aplicações para evitar competição.

OBSERVAÇÕES

No momento da aplicação não é recomendável misturar com qualquer outro produto. O MycoUp não apresenta qualquer intervalo de segurança, trata-se de um produto Resíduo Zero.

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 12 meses.

Os microrganismos podem provocar reacções de sensibilidade.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

Armazenar em local fresco e seco na embalagem original.

Temperatura de armazenamento óptima: 4 a 45°C.