

NOVAMIX SOLIDO 2AA
Referência: FT-00539**TEORES DECLARADOS**

Boro (B) sob a forma de ácido bórico, solúvel em água	8,8% p/p
Zinco (Zn) sob a forma de sulfato, solúvel em água	7,8% p/p
Outros teores:	
Aminoácidos livres	2,0% p/p

CLASSIFICAÇÃO

MISTURA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES MINERAIS

RESERVADO A UTILIZADORES PROFISSIONAIS

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Formulação	Sólido (pó)
pH (solução a 1%)	4,5
Solubilidade em água	Muito solúvel

PROPRIEDADES

O Novamix Solido 2AA é uma formulação sólida para a prevenção e correcção de carências de boro e zinco, micronutrientes essenciais a uma vasta gama de culturas. A adição de aminoácidos na formulação permite favorecer a absorção dos micronutrientes transporte destes nutrientes por toda a planta e contribuem para o equilíbrio fisiológico da mesma, o que resulta numa maior eficiência de uso destes nas culturas, especialmente nas fases de floração e vingamento dos frutos.

Este produto é recomendado para todo o tipo de cultura, em especial aquelas com tendência a sofrer de carências destes elementos, a sua aplicação é recomendada em fases-chave como a germinação, o desenvolvimento vegetativo e a frutificação, quando há elevadas necessidades destes micronutrientes, tanto por via foliar como em fertirrega.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Novamix Solido 2AA foi formulado para aplicação tanto por via foliar como em fertirrega em todos os tipos de cultura.

Aplicação	Dose	Aplicação
Foliar	2 - 3,5 kg/ha	Germinação floração e vingamento dos frutos
Fertirrega	2 - 5 kg/ha	Germinação floração e vingamento dos frutos

Utilizar um volume mínimo de água de 200 l/ha. Ajustar de acordo com o estado fenológico e/ou as necessidades da cultura.

OBSERVAÇÕES

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto aqueles de reacção alcalina ou que contenham fósforo ou óleos minerais. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.

Usar apenas quando há uma necessidade reconhecida. Não exceder a dose recomendada.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

Antes de usar, ler atentamente o rótulo.



H318 Provoca lesões oculares graves.

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecção /vestuário de protecção /protecção ocular / protecção facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE CONTROLE DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS e / ou médico.